



## De l'importance de la surveillance des océans

**Mots clés***Dosage par précipitation par la méthode de Mohr*

Une équipe de scientifiques est embarquée sur le bateau afin de vérifier la salinité de l'eau de mer. Surveiller sa valeur est important car d'une part, elle a une influence sur la vie aquatique, et d'autre part sur la célérité des ondes sonores dans l'eau de mer, dont la connaissance est utile pour déterminer les valeurs de différentes grandeurs physiques

**Données :**

Massé molaire des ions chlorure :  $M(Cl^-) = 35,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

À 25°C :

- Constante d'équilibre de solubilité du chlorure d'argent  $K_{s1}(AgCl_{(s)}) = 1,8 \times 10^{-10}$  ;
- Constante d'équilibre de solubilité du chromate d'argent  $K_{s2}(Ag_2CrO_4_{(s)}) = 1,6 \times 10^{-12}$ .

Le pH de l'eau de mer étudiée a une valeur égale à 7,2 et sa massé volumique  $\rho$  vaut  $1\ 025 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ .

**Définitions : chlorinité et salinité d'une eau de mer**

*Une eau de mer est une solution aqueuse dans laquelle sont dissous de nombreux ions (chlorure, sodium, sulfate, magnésium...). La salinité S de l'eau de mer correspond à la massé totale de sels dissous par kilogramme d'eau de mer. Elle est calculée à partir de la mesure de la chlorinité Ch grâce à la relation suivante :  $S = 1,80655 \times Ch$*

*La chlorinité Ch correspond à la massé d'ions chlorure par kilogramme d'eau de mer. Elle peut être déterminée par titrage des ions chlorure par les ions argent  $Ag^+$ .*

Après avoir prélevé un échantillon de l'eau de mer à étudier, les scientifiques cherchent à déterminer la concentration en ions chlorure  $Cl^-$  de celle-ci. Compte tenu de la forte valeur de la concentration en ions, une dilution de l'eau de mer au 1/10ème est réalisée pour effectuer le titrage avec une solution de nitrate d'argent. L'eau de mer correspond à la solution  $S_0$ . La solution diluée correspond à la solution  $S_1$ .


**Partie A – Dilution de l'eau de mer**

**1)** Déterminer la valeur du volume de solution  $S^0$  qui doit être prélevé pour préparer 100 mL de solution  $S_1$  diluée.

**2)** Donner le protocole expérimental permettant de préparer 100 mL de solution  $S_1$  à partir de la solution  $S_0$ . Nommer la verrerie nécessaire à cette préparation.


## Partie B – Dosage des ions chlorure par la méthode de Mohr et ses limites

Il consiste en un titrage colorimétrique des ions chlorure présents dans une solution à l'aide d'une solution de nitrate d'argent. L'équation support de la réaction de titrage est :



L'indicateur de fin de titrage utilisé pour repérer l'équivalence est le chromate de potassium.

En effet, après l'équivalence, les ions argent versés en excès réagissent avec les ions chromate pour former un précipité rouge de chromate d'argent. La transformation chimique est modélisée par l'équation



Le domaine de pH pour lequel on peut utiliser la méthode de Mohr est restreint au domaine :

$$6,5 < \text{pH} < 7,5.$$

En milieu basique ( $\text{pH} > 7,5$ ) une partie des ions  $\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})}$  est consommée par une réaction parasite de précipitation qui forme de l'hydroxyde d'argent  $\text{AgOH}_{(\text{s})}$ . Cette méthode ne peut donc pas être utilisée en milieu basique avec  $\text{pH} > 7,5$ .

En milieu acide ( $\text{pH} < 6,5$ ), le précipité de chromate d'argent  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4_{(\text{s})}$  est soluble : on ne peut donc plus repérer l'équivalence du dosage par apparition du précipité rouge brique. Cette méthode ne peut donc pas être utilisée en milieu acide avec  $\text{pH} < 6,5$ .

- 3) Indiquer, en justifiant la réponse, si la méthode de Mohr est utilisable dans le cas présent.
- 4) Donner deux caractéristiques d'une réaction de titrage.
- 5) Expliquer pourquoi la méthode de Mohr ne peut pas être utilisée en milieu basique.
- 6) Écrire l'équation de la réaction modélisant la dissolution dans l'eau du chlorure d'argent puis déterminer la valeur de la solubilité  $s_1$  du chlorure d'argent.
- 7) Écrire l'équation de la réaction modélisant la dissolution dans l'eau du chromate d'argent puis montrer que sa solubilité a une valeur  $s_2 = 7,4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ . On admet que le précipité qui se forme en premier est le précipité de chlorure d'argent.
- 8) Expliquer qualitativement pourquoi le chromate de potassium sert d'indicateur de fin de réaction.

## Partie C – Protocole de titrage

- Verser, à l'aide d'une pipette jaugée, un volume  $V_1 = 10,0 \text{ mL}$  de solution  $S_1$  d'eau de mer diluée dans un bêcher puis ajouter quelques gouttes de solution de chromate de potassium (la solution à titrer doit devenir jaune).
- Remplir la burette graduée avec la solution titrante de nitrate d'argent de concentration  $C_2 = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  et ajuster le zéro (éliminer toute bulle d'air).
- Verser la solution titrante dans le bêcher millilitre par millilitre pour déterminer grossièrement le volume à l'équivalence.
- Refaire le titrage en versant rapidement la solution titrante jusqu'à un volume inférieur à celui trouvé précédemment, puis verser la solution goutte à goutte jusqu'à l'apparition de la couleur rouge.
- On obtient un volume à l'équivalence  $V_{\text{eq}} = 11,2 \text{ mL}$ .

- 9)** Faire un schéma légendé du dispositif utilisé pour réaliser ce titrage, en précisant les noms pour la verrerie et les solutions utilisées.
- 10)** Établir la relation à l'équivalence entre la concentration en ions chlorure  $C_1$ , la concentration en ions argent  $C_2$  et les volumes  $V_1$  et  $V_{eq}$ .
- 11)** Déterminer la valeur de la concentration  $C_1$  des ions chlorure dans la solution  $S_1$  d'eau de mer diluée puis celle de la concentration des ions chlorure  $C_0$  dans l'eau de mer.
- 12)** Montrer que la salinité  $S$  de l'eau de mer étudiée vaut  $35,0 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$ . Le candidat est amené à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti.